

# Maagtorsie/maagkanteling

## Wat is een maagtorsie?

Als er zo veel gas wordt geproduceerd in de maag, dat de hond het niet kan uitboeren en het kan ook niet naar de dunne darm toe kan, dan spreekt men van een maagtorsie. De maag wordt een soort van ballon, de maag draait hierbij om zijn as. Hierdoor wordt de ingang en uitgang van de maag afgekneld. De milt, die aan de maag vast zit, draait mee. Komt vaak klem te zitten en zwelt op, de kans is groot dat het scheurt en hierdoor wordt de buikpijn verergerd.

De vakterm van maagtorsie is Torsio ventriculi.

Door een maagtorsie kan de hond in een shock raken, de kans hierop wordt vergroot wanneer de bloedcirculatie wordt afgesloten. De maagwand kan gaan doorlekken wanneer er niet snel ingegrepen wordt en de hond sterft aan een acute buikvliesontsteking of aan de shock.

## Wat zijn Symptomen?

Een maagtorsie ontstaat vaak wanneer je hond net heeft gegeten en veel beweging gehad heeft.

- De hond wordt onrustig, een maagtorsie doet veel pijn en de hond weet niet wat hij ermee aan moet. Hij zal gaan staan, rondjes lopen, liggen en erg onrustig gedrag vertonen.
- De hond kan het benauwd gaan krijgen omdat de maag op de longen drukt, de hond zal dus sneller gaan ademen.
- De hond zal gaan braken omdat hij het voedsel en gas uit de maag kwijt wil raken, maar er komt niets uit omdat de maag afgesloten is. De hond spuugt alleen maar speeksel uit.
- De hond zal een dikke buik krijgen omdat de maag opzwelt, dit is vooral links achter de ribboog.

## Wat moet je doen als je hond het heeft?

- Dit is een **SPOEDGEVAL** ga direct naar de dierenarts!
- Laat de hond zoveel mogelijk zelf lopen, ook naar die auto. (alleen al hij nog kan lopen)
- Bij het in de auto tillen **GEEN** druk uitoefenen op de buik.
- Laat de hond in de auto zelf zijn houding kiezen, zitten- liggen of staan. Dwing hem niet in een andere houding.

## Behandeling

### Infusen

De dierenarts zal eerst proberen de druk uit de maag te verminderen. Dit gebeurt door een sonde waardoor het gas kan weggkomen.

Of het lukt heeft met de draaiing en de stress van de hond te maken.

Een 360 graden draaiing is het veel moeilijker als wanneer de maag 45 graden is gedraaid.

Wanneer het gelukt is de sonde te plaatsen kan het gas naar buiten en meestal komt er ook wat voedsel mee naar buiten. Het is belangrijk dat alle voedselresten uit de maag komen omdat alle voedselresten de gasvorming weer kunnen verergeren.

## **Operatie**

Als het niet met de sonde lukt moet er geopereerd worden. Dit is risico vol omdat de hond al in een erg slechte toestand is. De maag wordt dan terug gedraaid en de milt wordt verwijderd omdat het te lang vastgezet heeft. De maag kan worden vastgezet, omdat er een grote kans is dat een maagtorsie nog een keer gebeurt. Het vastzetten van de maag wordt vaak gedaan nadat de hond weer is opgeknapt. Dit meteen doen brengt te veel risico met zich mee.

## **Voorkomen**

Vooral grote rassen zijn erg vatbaar voor een maagtorsie. (Riesenschnauzers- Duitse Herders- Duitse Doggen- enz.

Een aantal tips om een maagtorsie te voorkomen:

- Wacht anderhalf uur als de hond gegeten heeft met spelen of gaat wandelen.
- Geef je hond meerdere porties eten per dag.
- Zorg ervoor dat de hond niet schrokkerig eet omdat de hond dan te veel lucht inslikt. (Je kunt bijvoorbeeld een tennisbal in de voerbak leggen of een anti schrokbak gebruiken om het schrokken tegen te gaan.)
- Honden die een niet geëxpandeerde brok krijgen ( dus niet oplosbaar in water ) hebben een grotere kans op maagtorsie dan honden die een geëxpandeerde brok krijgen ( dus wel oplosbaar in water).
- Laat de hond niet ijskoud water drinken of sneeuw eten.

De hond kan ook een maagtorsie krijgen wanneer de hond een andere aandoening heeft in zijn darmen, hierdoor kan het gas niet getransporteerd worden en zal het in het lichaam blijven.

Deze informatie is ter kennisgeving.

Wij raden u te allen tijde aan om contact op te nemen met je dierenarts.