


Tekentijd

HET IS HELAAS WEER TEKENTIJD

Teken zijn spinachtige parasieten (8 potig) die zich ophouden in lage vegetatie, zoals struiken en grassen, maar ook in bossen. Wanneer de hond voorbij loopt laten ze zich vallen en nestelen zich in de huid om bloed te zuigen. Alhoewel de teek zelf irritatie kan veroorzaken, op de plek waar hij zich vasthecht, zijn vooral de ziekten die hij kan overbrengen van belang.

Waar zitten de teken op de hond?

Teken hebben voorkeursplaatsen voor nek, oren, kop en poten, maar kunnen ook elders op het lichaam voorkomen.



Hoe groot is een teek?

Een teek kan heel klein zijn (1 mm) tot heel groot (1 cm). Er zijn diverse stadia in de levenscyclus van de teek. De Volwassen vrouwtjes teek legt eieren. De eieren komen uit en worden larven (6 potig), na een bloedmaaltijd gaan deze over in een nymfe (8 potig). Zodra de nymfe een bloedmaaltijd heeft gehad ontstaat de volwassen teek (8 potig). Alleen de volwassen teken kunnen gigantisch opzwellen nadat ze gegeten hebben.

Een reactie in de huid

Als een teek zich vastbijt in de huid kan de hond hierop reageren door er aan te gaan likken of bijten. Op de foto hieronder zie je een heel klein teekje die maar 1,1 mm groot is. De teek heeft 6 poten en is daarom een larve



En als het beestje nog kleiner is?

Als je een beestje in de periode juli tot september, maar vooral in augustus vind dan moet je denken aan een oogstmijt of herfstmijt

In welke periode komen teken voor?

Bij teken zag je vroeger vaak pieken in het voor- en najaar, maar er komen nu meer teken voor dan vroeger en gedurende het gehele jaar moet je erop bedacht zijn.


Diagnose

Het vinden van teken op het lichaam geeft uiteraard de diagnose. Een tekenbeet gaat zelden gepaard met jeuk. Er kan een rode, wat gezwollen plek ontstaan op de plek van de tekenbeet, deze trekt na een paar dagen weg. De geïrriteerde plek is echter niet het hoofdprobleem. Dat **teken ziektes kunnen overbrengen** is een veel groter probleem.

Haal de teek binnen 24 uur van uw hond !

Therapie

Controleer uw huisdier dagelijks op teken en verwijder ze direct. Controleer na een wandeling in een bossige omgeving niet alleen uw hond, maar ook uzelf. Het is belangrijk dat de teek binnen 24 uur nadat deze zich vast heeft gebeten verwijderd wordt, dan is er namelijk nog geen verbinding tussen de gastheer en de maag van de teek. Er worden dan nog geen ziek makende bacteriën of andere ziekteverwekkers overgebracht.



Hoe moet de teek verwijderd worden?

De teek kan makkelijk verwijderd worden met een speciaal tangetje, een ticklasso van Trix of een otomhaakje.

Gebruik géén spiritus, alcohol of slaolie als u de teek gaat verwijderen. De teek kan dan juist overgeven en ziekmakende stoffen overbrengen in het bloed.

Nadat u de teek weggehaald heeft ontsmet dan de plek waar de teek gezeten heeft, met alcohol, spiritus of chloorhexidine.

Let op: draai de teek er rustig en voorzichtig uit. Dan komen de monddelen los uit de huid. Indien u te hard trekt dan trekt u het lichaam van de kop af en blijft de kop vastzitten in de huid. Hierop kan een ontsteking ontstaan.

Ziekten door teken overgebracht.

Teken kunnen helaas diverse ziektes overbrengen.

Lyme disease

De Nederlandse teek, de *Ixodus ricinus* of bruine schapenteek, kan de bacterie *Borrelia burgdorferi* of de verwekker van Lyme disease overbrengen.

De Zuid Europese teken, de *Dermacentor*-teek en de *Rhipicephalus*-teek kwamen tot voor kort alleen in landen rond de Middellandse zee voor, echter deze gevaarlijke teken zijn ook in Nederland opgedoken.

De *Dermacentor* brengt de ziekte *Babesia* en de *Rhipicephalus* brengt de ziekte *Ehrlichia* over.



Vrouwtjes:

Dermacentor

Ixodes

Mannetjes:

Dermacentor

Ixodes

Autochtone Ehrlichiose

Rhipicephalus teken die tot nu toe alleen in het buitenland voorkwamen worden in toenemende mate aangetroffen op honden die nooit in het buitenland zijn geweest. Deze teken brengen ehrlichiose over, een serieuze ziekte die te herkennen is aan bloedingen, koorts, gewichtsverlies en apathie

Autochtone Babesiose

Honden die nooit naar het buitenland zijn geweest worden besmet met ziektes die normaliter alleen in Zuid Europa voorkomen!

De Dermacentor reticulatus is inmiddels zo vaak door verschillende honden uit het buitenland meegenomen dat deze teek zich permanent in Nederland heeft gevestigd. Deze teek draagt babesiose over, een ziekte die te herkennen is aan koorts, bloedarmoede, donkere urine en nierfalen. Zonder behandeling is babesiose fataal voor de hond.

Preventie

Afgezien van een geïrriteerde plek waar de teek zat is het van belang om teken te bestrijden om ziektes te voorkomen. Dit laatste is vooral belangrijk in het buitenland, maar ook op bepaalde plaatsen in Nederland.

Als dierenartsen adviseren wij om tekenmiddelen te gebruiken die tweeledig werken: de teek afschrikken (repellent werken) en de teek afdoden.

Dit kan bijvoorbeeld met een tekenband van het merk Scalibor, een pipet (Pulvex) of een spray (Defendog).

In deze middelen zitten synthetische pyrethroïdes: Delta- of Permetrin.

Middelen die alleen de teek afdoden zijn bijvoorbeeld fipronil (Frontline) of pyripole (Practic) deze doden alleen de teek.

Interessante tekensites

We hebben diverse interessante websites verzameld die meer informatie over teken en de door teken overgebrachte ziektes beschrijven:

Teken gevraagd: Dead or alive!

De site van Tickbusters vraagt u als eigenaar om teken die u van uw huisdier afhaalt in te sturen om na te gaan wat voor een soort teek het is en of deze besmet was met een ziekte. Let op: Als u de moeite neemt om de teek in te sturen krijgt u na een paar weken een reactie:

wat was hetvoor een teek en was deze besmet!

Een site over door teken overgebrachte ziektes bij mensen Nederlandse Vereniging van Lyme Patiënten

De ziekte die van teken afkomstig kan zijn en ook bij ons mensen invloed op onze gezondheid kan hebben, heet **Teken encefalitis**

Encefalitis is een hersenontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt overgebracht door teken en komt voor in Europa, de Baltische staten en Rusland. De teken komen voor in bosachtig gebied en hoog gras. Van april tot november zijn de teken het meest actief en dan heb je de grootste kans om de ziekte op te lopen. De infectie kan ook worden overgedragen via rauwe melk van koeien, schapen of geiten.

De ziekte heeft veel verschillende namen:

- FSME (Früh Sommer Meningo Encephalitis, letterlijk “vroege zomer hersen- en hersenvliesontsteking”), komt vooral in Europa voor
- Russian Spring Summer Encephalitis, die vaak ernstiger verloopt en in Rusland voorkomt
- TBE (tick borne encephalitis): dit is een verzamelnaam voor beide soorten

Teken-encefalitis: verschijnselen

De meeste mensen die geïnfecteerd zijn, worden niet ernstig ziek, maar een minderheid krijgt hersen of hersenvliesontsteking, beiden ernstige ziektes.

Een tot drie weken na besmetting door een teek of een paar dagen na besmetting via rauwe melk krijg je griepachtige verschijnselen. De symptomen verbeteren, maar een deel van de mensen die besmet zijn wordt zieker, met koorts, nekstijfheid en overgeven. Dit zijn symptomen van hersenontsteking.

Wat te doen om Teken-encefalitis te voorkomen:

Probeer te voorkomen dat je wordt gestoken door teken, bijvoorbeeld door lange mouwen te dragen en niet in hoog gras of bos te kamperen. Je loopt het meeste kans op tekenbeten van april tot november. DEET is een effectief middel tegen teken.

Drink geen rauwe melk in de genoemde gebieden.

Er bestaat een vaccin tegen teken-encefalitis. Je krijgt dan drie injecties met tussenpozen van één maand en vijf maanden. Er bestaat ook een versneld schema: de tweede injectie krijg je dan twee weken na de eerste.

Na twee injecties ben je gedeeltelijk beschermd. Het beste is om een half jaar van te voren met de injecties te beginnen, maar zoals gezegd: het kan ook nog tot zo'n drie weken voor je vertrek.

Als je de volledige serie hebt gehad, ben je drie jaar beschermd.

Bron: dierenkliniekwilhelminaoord en vaccinatieopreis.nl